

名前

観察表

家庭での様子(保護者記入)			保育室での様子(看護師記入)		
	夜	朝		午前	午後
体温	℃ (時 分)	℃ (時 分)	体温	℃ (時 分)	℃ (時 分)
薬	内服した 時 分 (解熱剤 時 分)	内服した 時 分 (解熱剤 時 分)	薬	内服 時 分 () 時 分	内服 時 分 () 時 分
(量・内容) 食事			(量・内容) 食事		
鼻汁	多・少・無	多・少・無	鼻汁	多・少・無	多・少・無
咳	多・少・無	多・少・無	咳	多・少・無	多・少・無
喘鳴	有・無	有・無	喘鳴	有・無	有・無
嘔吐	有(回)・無	有(回)・無	嘔吐	有(回)・無	有(回)・無
睡眠	時 分 ~ 時 分		睡眠	時 分~ 時 分	時 分~ 時 分
機嫌	良・普・悪	良・普・悪	機嫌	良・普・悪	良・普・悪
排尿			排尿	回	回
排便	普・軟・固・下痢 (回)	普・軟・固・下痢 (回)	排便	普・軟・固・下痢 (回)	普・軟・固・下痢 (回)
その他			保育室での様子		

病児・病後児保育「キッズケアはなもも」 利用判断基準

一般症状	
体温	登園前38.0℃以下 ※解熱剤未使用時。
食欲	半分程度は摂取できている
消化器症状	強い腹痛がない。嘔吐・下痢が軽快傾向にある。

感染症	
インフルエンザ	左記の感染症は、一般的に登園許可書(医師の承諾)が必要とされるもので、飛沫感染しやすい、活動を通じて流行を広げる可能性がある伝染病です。
新型コロナウイルス感染症	
百日咳	
麻疹(はしか)	
風疹(三日はしか)	
水痘(みずぼうそう)	
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	
結核	
流行性角結膜炎(はやり目)	
侵襲性髄膜炎菌感染症 (髄膜炎菌性髄膜炎)	
腸管出血性大腸菌感染症 (O157、O26、O111など)	
急性出血性髄膜炎	
溶連菌感染症	
ウイルス性肝炎	
手足口病	
ヘルパンギーナ	
伝染性紅斑(りんご病)	
マイコプラズマ肺炎	
流行性下痢嘔吐症	
RSウイルス感染症	左記の感染症は、一般的に登園届が必要とされるもので、活動を通じて流行を広げる可能性がある伝染病です。
突発性発疹	
帯状疱疹	
アタマジラミ	
伝染性軟属腫(水いぼ)	
伝染性膿痂疹(とびひ)	
アタマジラミ	
伝染性軟属腫(水いぼ)	
伝染性膿痂疹(とびひ)	
アタマジラミ	
アタマジラミ	左記の感染症は出席停止の必要はありませんが、活動を通じて流行を広げる可能性がある伝染病です。症状改善までの期間、かかりつけ医の判断によりご利用可能です。
伝染性軟属腫(水いぼ)	
伝染性膿痂疹(とびひ)	
アタマジラミ	

外科的疾患	
捻挫・骨折など	一般保育所での保育が困難な場合

※その他の疾病につきましては、予約の際にお問い合わせください。